



Módulo 1

Introducción al TEA

- Concepto del Trastorno del Espectro Autista, epidemiología y bases neurobiológicas.
- Semiología, criterios diagnósticos DSM-5 y CIE-11.
- Señales de alerta, Screening de TEA y uso de M-CHAT-R/F

La Historia...

de los conceptos de autismo va desde Paul Eugen Bleuler...



Primeros Datos

Los primeros datos de prevalencia de autismo reportan cifras de 4-5/10.000 personas en los años 60.



Detección Temprana

La detección temprana del TEA se asocia a un mejor pronóstico en el plano social y educativo...



Pesquisa Oportuna



TEA

El concepto de "Trastorno del Espectro Autista" (TEA) se utiliza en contexto sanitarios...



Etiología

La etiología del TEA es multifactorial y poligénica..



Manifestaciones

Las manifestaciones del TEA pueden ser observables desde edades tempranas...



Se debe aplicar a los padres o cuidador principal del niño/a en los siguientes casos:





Cuando el niño/a entre 16 y 30 meses de edad tiene hermanos, gemelos o es hijo/a de padres con TEA.



Es primordial para iniciar una estimulación temprana en las áreas comprometidas. El Cuestionario Revisado de Detección del Autismo en Niños Pequeños con Entrevista de Seguimiento, M-CHAT-R/F, es un instrumento de detección que permite evaluar el riesgo de TEA en niño/as de 16 a 30 meses de edad. El M-CHAT-R/F tiene una sensibilidad y especificidad sobre el 80%.





Cuando en el control de salud infantil de los 18 meses, se encuentran alteradas las áreas de lenguaje y/o social de la evaluación de desarrollo psicomotor.



Cuando el niño/a no ha recibido control a los 18 meses y en controles posteriores (hasta los 30 meses) existe alteración en las áreas de lenguaje y/o Social en evaluación de Desarrollo Psicomotor.



La etiología del TEA es multifactorial y poligénica. Estudios recientes han revelado que aproximadamente el 80% del riesgo de una persona de desarrollar autismo proviene de factores genéticos heredados.





...por lo que la supervisión de salud, las instancias de atención en las Modalidades de Apoyo al Desarrollo Infantil (MADIs) y cualquier consulta de salud en general, constituyen una oportunidad ideal para la identificación de señales de alerta del TEA, permitiendo realizar una derivación precoz a evaluación diagnóstica, con el fin de que niño/as reciban una atención e intervención temprana.





...en el marco de las categorías diagnóstica contenidas en los Manuales DSM-5 y CIE-11. Es una condición del neurodesarrollo que se manifiesta en dificultades significativas en la iniciación, reciprocidad y mantención de la interacción y comunicación social al interactuar con los diferentes entornos, así como también en conductas o intereses restrictivos o repetitivos.





La historia de los conceptos de autismo va desde Paul Eugen Bleuler...

quien acuñó la palabra autismo que viene de la etimología griega "autos" que significa "sí mismo" opuesto a "otro", hasta Judy Singer quien definió el concepto de neurodiversidad.



...una mejora en la calidad de vida de los niño/as y sus familias y a una disminución en los costos tanto para las familias como para el sistema de salud.





En el año 2000, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades en Estados Unidos (CDC) estableció la Red de Monitoreo del Autismo y Discapacidades del Desarrollo como un sistema de vigilancia de la salud pública basado en la población para estimar la prevalencia de TEA en niños/as de 8 años (cohorte de edad). Se optó por tomar esta edad, dos años después del inicio de la escolarización obligatoria, por considerar que el diagnóstico debía ya ser estable. La última prevalencia reportada el año 2020 es de 1/36 con una relación varón: mujer= 4:1.



Cuando existe consulta espontánea por sospecha de TEA, entre edades de 16 y 30 meses.

Cuando existe inquietud de algún profesional del equipo de salud sobre alguna sospecha en el desarrollo del niño/a entre 16 y 30 meses de edad.