



## Módulo 2

Evaluación Diagnóstica Integral en Niños, niñas, adolescentes y adultos

- Diagnóstico diferencial en TEA
- Evaluación y Diagnóstico de Comorbilidades y Evaluación Etiológica

### La Evaluación Diagnóstica Integral (EDI)

consiste en...



Evaluación



Diagnóstico Diferencial



EL TEA...



NNA con TEA...



El diagnóstico de TEA es esencialmente clínico...



No es necesario pedir a todo/as lo/as niño/as con TEA un **electroencefalograma** ni una **neuroimagen**.

El **TEA Sindromático** es necesario sospecharlo utilizando las señales de alerta personal, familiar y del examen físico.

La **evaluación clínica** es la principal herramienta que guía la necesidad de realizar estudios complementarios orientados a determinar una etiología específica.

Persona Autista



Existen varias condiciones genéticas que presentan características compatibles con TEA, como por ejemplo :





A pesar de compartir características, cada persona autista es único/a y diferente por eso hablamos de trastorno del espectro del autismo, ya que no hay una sola forma de ser autista , por lo anterior el abordaje debe ser individualizado y personalizado.





...frecuentemente puede cursar con comorbilidades como las ya descritas (DI,TDAH,TL) , pero también con Trastornos de Modulación Sensorial, Epilepsia, Trastornos del Sueño, Trastornos Motores, Problemas Gastrointestinales, Trastorno de Ansiedad, Trastorno Depresivo, etc.





La evaluación no debe centrarse únicamente en el diagnóstico, sino que debe considerar también los factores protectores y los riesgos a los que se enfrenta una persona, así como su funcionamiento físico, psicológico y social en todos los casos, con el objetivo principal de identificar las necesidades de tratamiento y atención.





Para el diagnóstico diferencial del TEA son necesarias consideraciones clínicas y buenas prácticas relacionadas con diagnósticos concurrentes comunes como Discapacidad Intelectual (DI), Trastorno por Déficit de Atención/Hiperactividad (TDAH), Trastorno de Lenguaje (TL), etc. y otros que pueden ser parte del desarrollo neurotípico como Rituales, Ecolalia, Estereotipias, etc.





Muchas de las dificultades en la calidad de vida del NNA con TEA pueden deberse a la no detección de una comorbilidad. Alteraciones severas del procesamiento sensorial, comorbilidades psiquiátricas, epilepsia de difícil control son algunas de las situaciones del autismo que pueden generar un alto nivel de angustia, tristeza e incertidumbre en los padres y pueden ocurrir en NNA independiente de su nivel de necesidades de apoyo.





...En caso de duda diagn3stica, se recomienda el uso de herramientas estandarizadas, preferentemente validadas en el contexto local, como complemento 3til para la confirmaci3n diagn3stica, pero no como un sustituto del juicio cl3nico de los profesionales que intervienen en el diagn3stico.





...un proceso secuencial e interdisciplinario que incluye la confirmación diagnóstica del TEA a través de la evaluación de la presencia de sus características según criterios diagnósticos, la realización de una historia del desarrollo, examen físico y la evaluación observacional del niño/a, como también de otros aspectos claves, como la evaluación de habilidades lingüísticas expresivas y físicas/sensoriales, la valoración de dificultades emocionales o de comportamiento, y de factores socioambientales.





Un diagnóstico oportuno de estas condiciones genéticas permitirá optimizar su abordaje individual y en muchos casos hacer una consejería genética.

