

EDADES PARA LAS QUE ESTÁN APROBADAS LAS DISTINTAS VACUNAS

VACUNAS	EDADES DE ADMINISTRACIÓN
BCG	Desde recién nacido (RN) (*)
HEPATITIS B	Desde recién nacido (RN)
HEXAVALENTE	Desde 6 semanas de edad hasta los 24 meses / Por recomendación internacional hasta 6 años, 11 meses y 29 días (**)
NEUMOCÓCICA CONJUGADA 13v	A partir de las 6 semanas de edad
SRP	A partir de los 12 meses de edad (o 6 meses) (***)
MENINGOCÓCICA CONJUGADA: NIMENRIX®	A partir de las 6 semanas (Certificada por el ISP en 2019)
HEPATITIS A	A partir de los 12 meses de edad
VARICELA	A partir de los 12 meses de edad
dTpa	A partir de los 4 años de edad
VIRUS PAPILOMA HUMANO	A partir de los 9 años de edad
NEUMOCÓCICA POLISACÁRICA 23v	A partir de los 2 años de edad
TOXOIDE DIFTÉRICO-TETÁNICO	A partir de los 7 años de edad
RABIA	Desde recién nacido (RN)
HAEMOPHILUS INFLUENZAE TIPO b	A partir de los 2 meses hasta menores de 6 años / Adolescentes y adultos de grupos especiales (**)
INFLUENZA	A partir de los 6 meses de edad
FIEBRE AMARILLA	A partir de los 9 meses de edad, hasta menores de 60 años
IPV	A partir de los 2 meses de edad

(*) Se indica administración en R.N, con peso mayor o igual a 2.000 grs. y en niños/niñas mayores no vacunados administrar vacuna BCG, con edad menor o igual a 4 años, según Ordinario B27 N°31 del 04 de enero 2019.

(**) Las edades de administración de estas vacunas, están respaldadas por la recomendación internacional de OMS.

(***). La vacuna SRP puede ser administrada desde los 6 meses en caso de viaje a zonas de riesgo, esta dosis no debe ser considerada como dosis válida.