

## **COSTOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO Y USO DE LOS SERVICIOS DE SALUD**

La violencia de género implica un amplio número de costos, que afectan el bienestar de la propia mujer, sus hogares y comunidades. Estos costos pueden hacer referencia a costos directos para la mujer y estar centrados en el gasto de bolsillo que realizan las mujeres para costear la atención por situaciones de salud derivadas de la violencia.

Además, los costos directos para la mujer se relacionan con menor participación laboral, ausencias laborales o menores ingresos derivados de la exposición a la violencia. Un estudio realizado en Chile en 2009, confirma que los años de vida perdidos por femicidio íntimo en 2009 alcanzaron a 2.829 (4,5% de los años perdidos por muertes por lesiones intencionales en 2004, estimación de referencia) y el número de muertes fue de 67 (2,6% de las muertes por dicha causa).

Para las mujeres el promedio de años laborales perdidos fue de 29 años y para los hombres de 24 años. A ello se agregan los costos sociales derivados de la violencia, en Salud: atención médica, tratamiento y medicación; en Servicios Sociales: albergues, servicios para crisis, trabajo social; en Justicia y Seguridad Ciudadana: policía, Tribunales, asistencia jurídica, prisión; en las Organizaciones de la Sociedad Civil: asesoramiento, concienciación pública, investigaciones, horas de voluntariado. Un amplio estudio realizado en los Estados Unidos descubrió que la utilización de los servicios de salud era más alta entre las mujeres involucradas en relaciones de maltrato continuo.

En cambio, es menos probable que las mujeres víctimas de violencia de pareja busquen servicios de atención preventiva, como mamogramas, exámenes para medir colesterol y presión arterial y pruebas de detección de cáncer. Esto tiene implicaciones claras para la salud general de las mujeres víctimas de violencia y también para los costos sanitarios ya que la prevención es generalmente más eficaz en función de los costos que el tratamiento.

En un estudio de más de 3.000 mujeres efectuado en los Estados Unidos, los costos sanitarios anuales eran 42% más elevados en las que informaban violencia física infligida por sus parejas en el momento del estudio y entre 19% y 24% más altos en las que habían sido víctimas de violencia en los cinco años precedentes. En conclusión, las mujeres que sufren violencia de género tienen más necesidades de salud y solicitan servicios de salud con mayor frecuencia que la población en general, y la utilización de estos servicios crece a medida que aumentan la frecuencia y la gravedad de la violencia.