



## Consideraciones para utilizar Glibenclamida

### 1. Dosificación:

- Iniciar siempre con dosis bajas (2.5 mg)
- Efectuar ajustes lentos
- Evitar dosis máxima (máximo 15 mg<sup>1</sup>)
- No asociar con insulinas basales (6,9)
- No usar con insulinas prandiales (9)

### 2. Adulto mayor

- Se **recomienda evitar** el uso de GBC en adultos mayores de 60 años (10)
- NO USAR en adultos mayores frágiles que tienen especial vulnerabilidad a la hipoglicemia (mayores de 65 años, dependientes, con trastornos cognitivos, enflaquecidos o con alimentación irregular y mayores de 70 años independiente de su estado funcional)

### 3. Enfermedad renal crónica (11)

- Evitar su uso con VFG <60 mL/min/1.73m<sup>2</sup>
- No usar con VFG <45 mL/min/1.73m<sup>2</sup>

### 4. Daño hepático crónico

- El riesgo de hipoglicemia por SU se incrementa significativamente en pacientes con insuficiencia hepática debido a su metabolismo hepático, por lo que idealmente se debe evitar el uso de estos fármacos en pacientes con insuficiencia hepática moderada a severa. Si se usa GBC, se recomienda usar con precaución y en dosis bajas en casos de insuficiencia hepática moderada y **NO** usar en insuficiencia hepática severa (12)

### 5. Post alta hospitalaria

En pacientes usuarios de GBC que se hospitalizan, al alta indicar dosis menores a las usadas en forma previa a la hospitalización y ajustar lentamente la dosis según objetivo metabólico.

**6. Educación:** Todo paciente en tratamiento con SU debe ser educado acerca de los riesgos y síntomas de hipoglicemia, importancia de respetar horarios de alimentación y conducta a seguir frente a síntomas de hipoglicemia o valores bajos de glicemia en autocontrol.

---

<sup>1</sup> 7.5 mg / 2 veces al día